




POULAINS

PROBLÉMATIQUE	<i>Strongyloides westeri</i> si prévalence dans l'élevage, ascaris	Ascaris, strongles	Ascaris, strongles, ténias 	Ascaris, strongles, ténias, gastérophiles
SOLUTION	<p>Avant 2 mois Fenbendazole si <i>Strongyloides westeri</i> avec posologie particulière</p> <p>À 2 mois Fenbendazole ou pyrantel ou ivermectine</p>	<p>À 4 mois Fenbendazole ou pyrantel ou ivermectine</p>	<p>À 6 mois Ivermectine</p>	<p>À 9 mois Ivermectine + praziquantel ou moxidectine + praziquantel</p>

JEUNES DE 1 À 3 ANS

PROBLÉMATIQUE	Tuer les larves de cyathostomes qui se réactivent, limiter l'infestation des pâtures, grands strongles, risque d'ascaris encore présent.	Limiter l'infestation par les strongles adultes, risque d'ascaris encore présent. 	Limiter l'infestation par les strongles adultes, risque d'ascaris encore présent.	Tuer les larves de petits strongles avant l'enkystement, tuer les larves de grands strongles en migration, tuer les larves de gastérophiles avant l'hiver, éliminer les ténias à leur pic d'infestation.
SOLUTION	Ivermectine ou moxidectine	Pyrantel ou fenbendazole	Pyrantel ou fenbendazole ou ivermectine ou moxidectine	Ivermectine + praziquantel ou moxidectine + praziquantel

CHEVAUX ADULTES AU PRÉ

PROBLÉMATIQUE	Tuer les larves de cyathostomes qui se réactivent, limiter l'infestation des pâtures.	Se baser sur le risque épidémiologique, coproscopies individuelles pour limiter l'infestation par les strongles adultes. 	Se baser sur le risque épidémiologique, coproscopies individuelles pour limiter l'infestation par les strongles adultes.	Tuer les larves de petits strongles avant l'enkystement, tuer les larves de grands strongles en migration, tuer les larves de gastérophiles avant l'hiver, éliminer les ténias à leur pic d'infestation.
SOLUTION	:: SI RISQUE PARASITAIRE FAIBLE Ivermectine ou moxidectine	Pyrantel ou fenbendazole ou ivermectine ou moxidectine	Pyrantel ou fenbendazole ou ivermectine	Ivermectine + praziquantel ou moxidectine + praziquantel
	:: SI RISQUE PARASITAIRE MOYEN, FORT OU NON ÉVALUÉ Ivermectine ou moxidectine			Ivermectine + praziquantel ou moxidectine + praziquantel

CHEVAUX ADULTES AU BOX *Attention aux chevaux qui passent l'été au pré !*

PROBLÉMATIQUE	Strongles, ténias, oxyures			Strongles, ténias, oxyures, gastérophiles
SOLUTION	Ivermectine ou moxidectine			Ivermectine + praziquantel ou moxidectine + praziquantel